

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Romania
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

DORADDA 

ANTRACOL 70 WP-20g



Evaluare: Nu a fost evaluat înc?
[Pune o întrebare despre acest produs](#)

ANTRACOL 70WP

Substanta activa: propineb 70%

Formulare: WP (pulbere umectabila)

Toxicitate: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.



Mod de ambalare: plic 20g

Clasificare: fungicid de contact pentru combaterea bolilor la cartof, tomate, castraveti, ceapa, vita de vie, mar, par, cires, hamei

Spectru de combatere: manzana?, alternarioza?, patologii alb?, patologii cafenie, rap?n

Cultura: castravei?, tomate, cartofi, ceapă, măr, pătrunjel, viță de vie

Mod de acțiune Antracol este un fungicid organic de contact din grupa ditiocarbamatilor, care blochează germinatia sporilor si patrunderea miceliului ciupercilor patogene in plante. Are un bun efect remanent care se manifesta pe o durata de 7-10 zile pe zona tratata in functie de conditiile locale. Este un fungicid de tip multisistemic care impiedica aparitia formelor rezistente.

Perioada de protectie este in functie de conditiile locale si variaza de la 7 la 14 zile .

In conditii de infestare puternica, se va utiliza doza maxima omologata.

Mod de utilizare

Antracol 70 WP se utilizeaza pentru tratamente pe vegetatie, efectuate preventiv la avertizare sau cand sunt conditii favorabile de dezvoltare a patogenilor dupa cum urmeaza:

Mar, par: 0,2% – 0,3% impotriva rapanului (*Venturia spp.*). Se recomanda 1- 3 tratamente: 2 inainte de inflorit, unul imediat dupa inflorit, la un interval minim intre stropiri de 7 zile si de 21 zile in perioada infloritului. Cantitatea de solutie este de 1000-1500 l/ha.

Timp de pauza inaintea recoltarii: nu se aplica.

Cires: 0,2% (2,0 kg/ha) impotriva antracnozei (*Cocomyces hiemalis*). Se recomanda 1- 2 tratamente in intervalul fenologic prefloral – ovar vizibil, la un interval minim intre stropiri de 10 zile. Cantitatea de solutie este de 1000 l/ha.

Timp de pauza: 28 de zile.

Vita de vie: 0,2 – 0,3% impotriva manei (*Plasmopara viticola*). Se aplica maxim 4 tratamente, 2 inainte si 2 dupa inflorit, la un interval

de 7 – 14 zile intre stropiri si 30 de zile intre ultimul tratament inaintea infloritului si primul dupa inflorit.

Cantitatea de solutie este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauza: 60 zile

Cartof: 1,5 – 2,5 kg/ha impotriva manei (*Phytophthora infestans*) si a patarii brune (*Alternaria solani*). Se aplica in cel mult 3 tratamente, la un interval de 14 zile incepand cu fenofaza inaintea incheierea randurilor. Cantitatea de solutie este de 300 - 400 l/ha.

Timp de pauza: 14 zile.

Tomate: 0,2%(2,0 kg/ha) impotriva patarii albe (*Septoria lycopersici*), patarii brune (*Fulvia fulvum*), manei (*Phytophthora infestans*) si alternariozei (*Alternaria solani*). Se aplica maximum 3 tratamente la un interval de 7 – 10 zile intre stropiri.

Cantitatea de solutie este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauza: 7 zile.

Castraveti: 0,2% (2,0 kg /ha) impotriva manei (*Pseudoperonospora cubensis*) si alternariozei (*Alternaria cucumerina*). Se recomanda a fi efectuate cel mult 3 tratamente pe sezon, cu un interval intre stropiri de 7 – 10 zile. Cantitatea de solutie este de 600-1000 l/ha.

Timp de pauza: 3 zile.

Ceapa: 0,2 – 0,25% impotriva manei (*Peronospora destructor*). Se recomanda a fi efectuate cel mult 2 tratamente, cu un interval intre stropiri de 7 – 10 zile. Cantitatea de solutie este de 600 l/ha.

Timp de pauza: 21 zile.

Hamei: 0,2% impotriva manei (*Pseudoperonospora humuli*). Se recomanda a fi efectuate cel mult 3 tratamente, cu un interval de 7– 10 zile intre stropiri. Cantitatea de solutie este de 1500 -2000 l/ha.

Timp de pauza: 60 zile.

Măsuri de igienă și protecție a muncii

Fraze de risc

Iritant pentru cîile respiratorii și pentru ochi. A se evita contactul cu ochii și cu pielea.

În caz de contact spălati și clarifi către apă curat?

În caz de intoxicație consultați urgent medicul.

Fraze de siguranță

Este interzis consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul manipulării.

Folosiți mănuși și echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

Mod de păstrare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, batrinilor și persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, băuturi, furaje pt animale.

Se păstrează la loc uscat și corect.

Valabilitate

Vezi termenul de pe ambalaj !

Preț unitar

- Prețurile NU conțin TVA !

- Pentru livrări en-gros, solicitați lista de prețuri !

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Romania
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

D O R A D D A

