

ANTRACOL 70 WP-20g



Preț: Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

ANTRACOL 70WP

Substanța activă: propineb 70%

Formulare: WP (pulbere umectabilă)

Toxicitate: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Mod de ambalare: plic 20g

Clasificare: fungicid de contact pentru combaterea bolilor la cartof, tomate, castraveti, ceapa, vita de vie, mar, par, cires, hamei

Spectru de combatere: man?, alternarioz?, p?taea alb?, p?taea cafenie, rap?n

Cultura: castrave?i, tomate, cartofi, ceap?, m?r, p?r, vi?? de vie

Mod de acțiune Antracol este un fungicid organic de contact din grupa ditiocarbamatilor, care blocheaza germinatia sporilor si patrunderea miceliului ciupercilor patogene in plante. Are un bun efect remanent care se manifesta pe o durata de 7-10 zile pe zona tratata in functie de conditiile locale. Este un fungicid de tip multisit care impiedica aparitia formelor rezistente.

Perioada de protectie este in functie de conditiile locale si variaza de la 7 la 14 zile .

In conditii de infestare puternica, se va utiliza doza maxima omologata.

Mod de utilizare

Antracol 70 WP se utilizeaza pentru tratamente pe vegetatie, efectuate preventiv la avertizare sau când sunt conditii favorabile de dezvoltare a patogenilor dupa cum urmeaza:

Mar, par: 0,2% – 0,3% impotriva rapanului (*Venturia* spp.). Se recomanda 1- 3 tratamente: 2 inainte de inflorit, unul imediat dupa inflorit, la un interval minim intre stropiri de 7 zile si de 21 zile in perioada infloritului. Cantitatea de solutie este de 1000-1500 l/ha.

Timp de pauza inaintea recoltarii: nu se aplica.

Cires: 0,2% (2,0 kg/ha) impotriva antracnozei (*Cocomyces hiemalis*). Se recomanda 1- 2 tratamente in intervalul fenologic prefloral – ovar vizibil, la un interval minim intre stropiri de 10 zile. Cantitatea de solutie este de 1000 l/ha.

Timp de pauza: 28 de zile.

Vita de vie: 0,2 – 0,3% impotriva manei (*Plasmopara viticola*). Se aplica maxim 4 tratamente, 2 inainte si 2 dupa inflorit, la un interval

de 7 – 14 zile intre stropiri si 30 de zile intre ultimul tratament inaintea infloritului si primul dupa inflorit.

Cantitatea de solutie este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauza: 60 zile

Cartof: 1,5 – 2,5 kg/ha impotriva manei (*Phytophthora infestans*) si a patarii brune (*Alternaria solani*). Se aplica in cel mult 3 tratamente, la un interval de 14 zile incepand cu fenofaza inainte de incheierea randurilor. Cantitatea de solutie este de 300 - 400 l/ha.

Timp de pauza: 14 zile.

Tomate: 0,2%(2,0 kg/ha) impotriva patarii albe (*Septoria lycopersici*), patarii brune (*Fulvia fulvum*), manei (*Phytophthora infestans*) si alternariozei (*Alternaria solani*). Se aplica maximum 3 tratamente la un interval de 7 – 10 zile intre stropiri.

Cantitatea de solutie este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauza: 7 zile.

Castraveti: 0,2% (2,0 kg /ha) impotriva manei (*Pseudoperonospora cubensis*) si alternariozei (*Alternaria cucumerina*). Se recomanda a fi efectuate cel mult 3 tratamente pe sezon, cu un interval intre stropiri de 7 – 10 zile. Cantitatea de solutie este de 600-1000 l/ha.

Timp de pauza: 3 zile.

Ceapa: 0,2 – 0,25% impotriva manei (*Peronospora destructor*). Se recomanda a fi efectuate cel mult 2 tratamente, cu un interval intre stropiri de 7 – 10 zile. Cantitatea de solutie este de 600 l/ha.

Timp de pauza: 21 zile.

Hamei: 0,2% impotriva manei (*Pseudoperonospora humuli*). Se recomanda a fi efectuate cel mult 3 tratamente, cu un interval de 7– 10 zile intre stropiri. Cantitatea de solutie este de 1500 -2000 l/ha.

Timp de pauza: 60 zile.

M?suri de igien? ?i protec?ia muncii

Fraze de risc

Iritant pentru c?ile respiratorii ?i pentru ochi. A se evita contactul cu ochii ?i cu pielea.

În caz de contact sp?lati ?i cl?ti?i bine cu ap? curat?.

În caz de intoxica?ie consulta?i urgent medicul.

Fraze de siguran??

Este interzis consumul de alimente, b?uturi ?i fumatul în timpul manipulării.

Folosiți m?nusi ?i echipament de protec?ie.

A se utiliza un ambalaj corespunz?tor pentru evitarea contamin?rii mediului.

Mod de p?strare

A nu se l?sa la îndemâna copiilor, batrinilor si persoanelor neautorizate.

A se p?stra departe de alimente, b?uturi, furaje pt animale.

Se p?streaza la loc uscat si r?coros.

Valabilitate

Vezi termenul de pe ambalaj !

Pre? unitar

- Pre?urile NU con?in TVA !

- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timișoara
România
Timiș
+40 256 204912
+40 256 204912

