

ATONIK 100ml



Prezentație: Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

ATONIK

Stimulator de creștere pentru legume, cartof, sfeclă de zahăr, floarea soarelui, viș de vie și plante ornamentale.
Nu este cancerigen sau mutagen.

Compoziție:

Soluție apoasă de culoare cafenie cu miros caracteristic, care conține:

- 0,2% Ortonitrofenolat de sodiu
- 0,3% Praranitrofenolat de sodiu
- 0,1% 5-Nitroguaiacolat de sodiu

Mod de acțiune

Atonik este un stimulator de creștere biochimic, care se absoarbe și se translocă foarte rapid în plantă, determinând activarea fluxului citoplasmatic, translocarea mai rapidă a sevei brute, flux ascendent mai rapid al mineralelor precum și creșterea conținutului de clorofil din plantă.

Acțiunea Atonikului este diferită de cea a stimulatorilor hormonalți evitând suprasaturarea cu apă a țesuturilor.

Atonik stimulează înrădăcinarea, germinarea semințelor și a polenului, proliferarea și creșterea lăstarilor, fertilitatea florilor și formarea fructelor.

Modul de utilizare:

Atonik se aplică prin înmuierea semințelor, butașilor precum și prin pulverizare pe plante și fructe în timpul vegetației.

Doza recomandată este de 0,5 - 0,75 litri Atonik/ha, în funcție de cultură.

Cantitatea de apă recomandată este de 400 - 800 litri/ha, în funcție de cultură.

La legume

Atonik se utilizează de 2-4 ori pe an în următoarele faze:

- înmuierea semințelor sau a butașilor
- stropirea răsadurilor, a bobocilor florali, pe frunze și fructe

La plante ornamentale

Atonik se utilizează de 2-3 ori pe an în următoarele faze:

- înmuierea butașilor
- stropirea răsadurilor și a plantelor

La viș de vie

Atonik se utilizează de 2-3 ori pe an în următoarele faze:

- pulverizarea soluției deasupra lăstarilor, inflorescenței înainte de înflorire
- pulverizarea soluției deasupra frunzelor și strugurilor când boabele sunt de mărimea bobului de mazăre

La cartof

Atonik se utilizează de 2 ori pe an în faza:

- înbobocit - sfârșit de înflorire

La sfeclă de zahăr

Atonik se utilizează de 2 ori pe an în faza formării celei de-a 10-a --- 15-a frunze.

La florea soarelui

Atonik se utilizează de 2 ori pe an în faza formării celei de-a 7 frunze și începutul înfloririi.

Măsuri de igienă și protecția muncii

A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și bătrânilor.

Se păstrează în ambalajul original, bine închis, la loc uscat și răcoros, departe de alimente, băuturi și furaje pt animale.

A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

În caz contrar, locul se spală foarte bine cu apă curată.

Dacă s-a produs intoxicația, anunțați de urgență medicul și urmați tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii și depozitării necorespunzătoare, producătorul nu își asumă nici o responsabilitate.

În conformitate cu legislația EU:

- este interzisă aruncarea ambalajului gol în ape curgătoare sau în orice surse de apă.
- este interzisă depozitarea sau utilizarea la o distanță mai mică de 50 m de la malul apelor.

Valabilitate: vezi data de pe ambalaj.

Preț unitar

- **Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !**