

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timișoara
România
Timiș
+40 256 204912
+40 256 204912

DORADDA 

BRAVO 500 SC-20ml



Precauție: Nu a fost evaluat în țară.

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

BRAVO 500 SC

Substanța activă: clorotalonil 500 g/litru

Formulare: SC (suspensie concentrată)

Toxicitate: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Mod de ambalare: flacon 20ml

Clasificare: fungicid de contact pentru combaterea unui spectru larg de patogeni la culturile de legume, cartofi, sfecla, cereale, pomi fructiferi, vita de vie.

Spectru de combatere: alternarioza, cercosporioza, patarea cafea, patarea roșie a frunzelor, bășicarea frunzelor, antracnoza, mană, putregaiul frunzelor, putregaiul cenusiu, făinare, rapan, boli foliare și ale spicului la cereale.

Mod de acțiune

Bravo 500 SC este un fungicid de contact cu aplicare preventivă, înainte de apariția bolii, ce asigură plantei o protecție foarte bună contra agenților patogeni.

Intervalul dintre tratamente este de 7 - 14 zile.

Modul de utilizare

Tomate - în concentrație de 0.2%(1.5-2L/ha) sau 200ml la 100-130 litri de apă, combate: mană (Phytophthora infestans), alternarioza (Alternaria solani), patarea cafea (Cladosporium fulvum), antracnoza (Colletotrichum coccodes), putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea).

- în concentrație de 0.4% sau 200ml la 50 litri de apă, combate: septorioza sau patarea albă a frunzelor (Septoria lycopersici).
Timp de pauză 3 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Ceapa - doza de 1.5-2L/ha, sau 200 ml la 80 litri de apă combate mană (Peronospora destructor), putregaiul cenusiu (Botrytis allii).

Timp de pauză 14 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Cartof - doza de 1.5-2L/ha, sau 200 ml la 60-80 litri de apă combate mană (Phytophthora infestans), alternarioza (Alternaria solani).

Timp de pauză 7 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Castraveti - doza de 1.5-2L/ha, sau 200 ml la 80 litri de apă combate mană (Pseudoperonospora cubensis), alternarioza (Alternaria cucumerina), făinare (Sphaerotheca fuliginea).

Timp de pauză 3 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Pepeni galbeni - în concentrație de 0.25% sau 200 ml la 80 litri de apă combate mană (Pseudoperonospora cubensis), făinare (Sphaerotheca fuliginea).

Timp de pauză 3 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Mar - în concentrație de 0.25% sau 200 ml la 80 litri de apă combate rapan (Venturia inequalis) - (2.5L/ha infecții secundare).

Timp de pauză 21 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Par - în concentrație de 0.15% sau 200 ml la 100-130 litri de apă combate rapan (Venturia pirina).

Timp de pauză 21 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Prun - în concentrație de 0.15% sau 200 ml la 100-130 litri de apă combate monilioza (Monilinia laxa), patarea roșie (Polistigma rubrum).

Timp de pauză 21 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Piersic - în concentrație de 0.15% sau 200 ml la 100-130 litri de apă combate bășicarea frunzelor (Taphrina deformans), monilioza (Monilinia laxa).

Timp de pauză 60 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Capsun - în concentrație de 0.25% sau 200 ml la 80 litri de apă combate putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea).

Timp de pauză 10 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Sfecla de zahăr: cercosporioza (Cercospora beticola) - 1,5-2L/ha sau 200ml la 100 litri de apă.

Timp de pauză 49 zile de la ultimul tratament până la recoltare.

Grau - în doza de 1.5L/ha, se aplică asociat cu alte produse, până la stadiul BBCH 69 pentru combaterea unui complex de boli foliare și ale spicului (*Erysiphe graminis*, *Septoria tritici*, *Fusarium spp.*, *Puccinia recondita*, *Helminthosporium tritici repens*).

Orz de toamnă - în doza de 1.5L/ha, se aplică asociat cu alte produse, până la stadiul BBCH 59 pentru combaterea unui complex de boli foliare și ale spicului (*Erysiphe graminis*, *Pyrenophora teres*, *Rhynchosporium secalis*).

Fitotoxicitate

Bravo 500 SC este bine suportat de plante la dozele recomandate și nu produce arsuri pe plante inclusiv pe organele florale.

Compatibilitate

Bravo 500 SC este un produs polivalent ce poate fi aplicat în amestec cu alte produse fitosanitare.

Măsuri de igienă și protecția muncii

Faze de risc

Iritant pentru căile respiratorii și pentru ochi. A se evita contactul cu ochii și cu pielea.

În caz de contact spălați și clătiți bine cu apă curată.

În caz de intoxicație consultați urgent medicul.

Faze de siguranță

Este interzis consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul manipulării.

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timișoara
România
Timiș
+40 256 204912
+40 256 204912



Folosiți mânuși și echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

Mod de păstrare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrânilor și persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, băuturi, furaje pt animale.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

Valabilitate

Vezi termenul de pe ambalaj !

Preț unitar

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !