

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Romania
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

D O R A D D A 

FUNGURAN OH 50WP-30g



Pre?are de lucru 6,50 leu + taxă inc?

Pre?ul de vânzare 6,00 lei

Pre?ul de vânzare f?r? taxe 5,50 lei

Reducere

Valoarea taxei 0,50 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)



Dunguran OH 50 WP

Substanta activa: 77% hidroxid de cupru, 50% Cu metalic

Formulare: WP (pulbere umectabila)

Toxicitate: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Mod de ambalare: plic 30g

Clasificare: fungicid de contact pentru combaterea bolilor la cartof, tomate, castraveti, fasole, ceapa, vita de vie, mar, par, cires, sfecla de zahar, hamei

Spectru de combatere: man?, alternarioz?, p?tarea alb?, p?tarea cafenie, patarea unghiulara, focul bacterian al rosaceelor, arsura comună și aureolata, rap?

Cultura: legume, m?r, p?r, vi?? de vie, cartof, sfecla de zahar, hamei

Mod de actiune - fungicid de contact cu o capacitate de penetrare în plante și de protejare foarte buna.

Aceste caracteristici conferă produsului capacitatea de a combate ciupercile patogene, în special din grupa Phycomycete (care produc mana), dar și focul bacterian al rozaceelor.

Funguran OH 50 WP are actiune preventiva foarte buna prin inhibarea germinatiei sporilor și de blocare a dezvoltării miceliului în planta.

Perioada de protecție este în funcție de condițiile locale și variază de la 7 la 14 zile .

În condiții de infestare puternică, se va utiliza doza maxima omologata.

Mod de utilizare

Funguran OH 50 WP se utilizează pentru tratamente pe vegetație, efectuate preventiv la avertizare sau când sunt condiții favorabile dezvoltării a patogenilor după cum urmează:

Tomate: 0,4%, (30g la 7,5 l apa) - împotriva manei (*Phytophtora infestans*). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 7 zile.

Sfecla de zahar: 0,4%(30g la 7,5 l apa) împotriva manei (*Peronospora schachtii*). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Hamei: 0,4%, 4kg/ha,(30g la 7,5 l apa) împotriva manei (*Peronoplasmodara humuli*). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 1.000 - 2.000 l/ha

Timp de pauză: 60 zile.

Castraveti: 0,3%, 3,0 kg /ha, (30g la 10 litri apa) - împotriva manei (*Pseudoperonospora cubensis*), patarea unghiulară (*Pseudomonas lachrymans*) - 0,4%, ,0 kg /ha, (30g la 7,5 litri apa). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 600-1000 l/ha.

Timp de pauză: 3 zile.

Mar, gutui: – combatе focul bacterian al rosaceelor (*Erwinia amylovora*) - prefloral - 0,2%(30g la 15litri apa), postfloral 0,04%(30g la 75litri apa), 0,3%(30g la 10 litri apa) împotriva rapanului (*Venturia inaequalis*).

Par, gutui - împotriva focului bacterian al rosaceelor (*Erwinia amylovora*) - prefloral - 0,3%(30g la 10litri apa), postfloral 0,04%(30g la 75litri apa).

Se recomandă 1- 3 tratamente: 2 înainte de înflorit, unul imediat după înflorit, la un interval minim între stropiri de 7 zile și de 21 zile în perioada înfloritului. Cantitatea de soluție este de 1000-1500 l/ha.

Timp de pauză înaintea recoltării: nu se aplică.

Fasole: 0,25%(30g la 12 l apa) împotriva arsura comună (*Xanthomonas phaseoli*), arsura aureolată (*Pseudomonas phaseolica*).

Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Vita de vie: 0,2 – 0,3% împotriva manei (*Plasmopara viticola*). Se aplică maxim 4 tratamente, 2 înainte și 2 după înflorit, la un interval

de 7 – 14 zile între stropiri și 30 de zile între ultimul tratament înaintea înfloritului și primul după înflorit.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauză: 60 zile

Cartof: 3 kg/ha (30g la 6 litri apa) împotriva manei (*Phytophtora infestans*). Se aplică în cel mult 3 tratamente, la un interval de 14 zile începând cu fenofaza înainte de încheierea randurilor. Cantitatea de soluție este de 300 - 400 l/ha.

Timp de pauză: 14 zile.

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

D O R A D D A



M?sur? de igien? ?i protec?ia muncii

Fraze de risc

Iritant pentru c?ile respiratorii ?i pentru ochi. A se evita contactul cu ochii ?i cu pielea.
În caz de contact spălati ?i cl?ti?i bine cu apă curat?.
În caz de intoxica?ie consulta?i urgent medicul.

Fraze de siguran??

Este interzis consumul de alimente, b?uturi ?i fumatul în timpul manipulării.
Folositi mânusi ?i echipament de de protec?ie.
A se utilizeaza un ambalaj corespunz?tor pentru evitarea contamin?rii mediului.

Mod de p?strare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, batrinilor si persoanelor neautorizate.
A se p?stra departe de alimente, b?uturi, furaje pt animale.
Se p?streaza la loc uscat si r?coros.

Valabilitate

Vezi termenul de pe ambalaj !

Pre? unitar

- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !
- Pre?urile NU con?in TVA !