

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23  
300180 Timișoara  
România  
Timis  
+40 256 204912  
+40 256 204912

**DORADDA** 

## FUNGURAN OH 50WP-30g



**Preț redus la 6,50 lei**

Prețul de vânzare 6,00 lei

Prețul de vânzare fără taxe 5,50 lei

Reducere

Valoarea taxei 0,50 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

---

### **FUNGURAN OH 50 WP**

**Substanța activă:** 77% hidroxid de cupru, 50% Cu metalic

**Formulare:** WP (pulbere umectabilă)

**Toxicitate:** toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

**Mod de ambalare:** plic 30g

**Clasificare:** fungicid de contact pentru combaterea bolilor la cartof, tomate, castraveti, fasole, ceapa, vita de vie, mar, par, cires, sfecla de zahar, hamei

**Spectru de combatere:** mană?, alternarioză?, pătarea albă?, pătarea cafenie, pătarea unghiulară, focul bacterian al roșaceelor, arsura comună și aureolată, rapăn

**Cultura:** legume, măr, păr, vișă de vie, cartof, sfecla de zahar, hamei

**Mod de acțiune** - fungicid de contact cu o capacitate de penetrare în plante și de protecție foarte bună.

Aceste caracteristici conferă produsului capacitatea de a combate ciupercile patogene, în special din grupa Phycomycete (care produc mană), dar și focul bacterian al roșaceelor.

Funguran OH 50 WP are acțiune preventivă foarte bună prin inhibarea germinăției sporilor și de blocare a dezvoltării miceliului în plantă.

Perioada de protecție este în funcție de condițiile locale și variază de la 7 la 14 zile.

În condiții de infestare puternică, se va utiliza doza maximă omologată.

### **Mod de utilizare**

Funguran OH 50 WP se utilizează pentru tratamente pe vegetație, efectuate preventiv la avertizare sau când sunt condiții favorabile de dezvoltare a patogenilor după cum urmează:

**Tomate:** 0,4%, (30g la 7,5 l apă) - împotriva manei (*Phytophthora infestans*). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Țimp de pauză: 7 zile.

**Sfecla de zahar:** 0,4%(30g la 7,5 l apă) împotriva manei (*Peronospora schachtii*). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

**Hamei:** 0,4%, 4kg/ha, (30g la 7,5 l apă) împotriva manei (*Peronosplasmopara humuli*). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 1.000 - 2.000 l/ha

Țimp de pauză: 60 zile.

**Castraveti:** 0,3%, 3,0 kg /ha, (30g la 10 litri apă) - împotriva manei (*Pseudoperonospora cubensis*), pătarea unghiulară (*Pseudomonas lachrymans*) - 0,4%, 0 kg /ha, (30g la 7,5 litri apă). Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de soluție este de 600-1000 l/ha.

Țimp de pauză: 3 zile.

**Mar, gutui:** – combat focul bacterian al roșaceelor (*Erwinia amylovora*) - prefloral - 0,2%(30g la 15l apă), postfloral 0,04%(30g la 75l apă), 0,3%(30g la 10 litri apă) împotriva rapanului (*Venturia inaequalis*.)

**Par, gutui** - împotriva focului bacterian al roșaceelor (*Erwinia amylovora*) - prefloral - 0,3%(30g la 10l apă), postfloral 0,04%(30g la 75l apă).

Se recomandă 1- 3 tratamente: 2 înainte de înflorit, unul imediat după înflorit, la un interval minim între stropiri de 7 zile și de 21 zile în perioada înfloritului. Cantitatea de soluție este de 1000-1500 l/ha.

Țimp de pauză înainte de recoltare: nu se aplică.

**Fasole:** 0,25%(30g la 12 l apă) împotriva arsura comună (*Xanthomonas phaseoli*), arsura aureolată (*Pseudomonas phaseolica*).

Tratamentele se aplică la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

**Vita de vie:** 0,2 – 0,3% împotriva manei (*Plasmopara viticola*). Se aplică maxim 4 tratamente, 2 înainte și 2 după înflorit, la un interval

de 7 – 14 zile între stropiri și 30 de zile între ultimul tratament înainte de înflorit și primul după înflorit.

Cantitatea de soluție este de 800 - 1000 l/ha.

Țimp de pauză: 60 zile

**Cartof:** 3 kg/ha (30g la 6 litri apă) împotriva manei (*Phytophthora infestans*). Se aplică în cel mult 3 tratamente, la un interval de 14 zile începând cu fenofaza înainte de încheierea randurilor. Cantitatea de soluție este de 300 - 400 l/ha.

Țimp de pauză: 14 zile.

---

**Măsuri de igienă și protecția muncii**

***Faze de risc***

Iritant pentru căile respiratorii și pentru ochi. A se evita contactul cu ochii și cu pielea.

În caz de contact spălați și clătiți bine cu apă curată.

În caz de intoxicație consultați urgent medicul.

***Faze de siguranță***

Este interzis consumul de alimente, băuturi și fumatul în timpul manipulării.

Folosiți mănuși și echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

***Mod de păstrare***

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrânilor și persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, băuturi, furaje pt animale.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

***Valabilitate***

Vezi termenul de pe ambalaj !

**Preț unitar**

- Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

- Prețurile NU conțin TVA !