

## SHAVIT F72WP - 200g



**Preparare:** Nu a fost evaluat înc?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

### SHAVIT F 72 WP

**Substanta activa:** 2% triadimenol + 70% folpet

**Formulare:** WP (pulbere umectabila)

**Toxicitate:** toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

**Mod de ambalare:** plic 200g

**Clasificare:** fungicid cu actiune sistematica si de contact, folsit pentru combaterea bolilor in culturile horticole.

**Spectru de combatere:** man?, fainare, alternarioz?, putregai cenusiu, rap?n

**Cultura:** castrave?i, tomate, pepeni, cartofi, ceap?, m?r, p?r, vi?? de vie

#### Mod de actiune

**Shavit F 72 WP** - este un fungicid complex con?inând dou? substan?e active cu actiune sistematica si de contact, împotriva celor mai importante boli care atac? culturile horticole. Actiunea sinergica a celor doua principii active, asigura un efect rapid, preventiv si curativ de lung? durata.

Perioada de protectie este in functie de conditiile locale si variaza de la 7 la 14 zile .

In conditii de infestare puternica, se va utiliza doza maxima omologata.

#### Mod de utilizare

**Shavit F 72 WP** - se utilizeaza pentru tratamente aplicate în perioada de vegetatie, efectuate preventiv la avertizare sau când sunt conditii favorabile de dezvoltare a patogenilor dupa cum urmeaza:

**Mar, par:** 0,2%, 2 kg/ha sau 20g la 10 litri ap? - împotriva rapanului (*Venturia spp.*), f?inarea (*Podosphaera leucotrice*). Se recomanda 1- 4 tratamente începând cu faza de dez mugurire, în alternan?? cu alte produse sistemic, la un interval minim intre stropiri de 7 zile si de 21 zile in perioada infloritului. Cantitatea de solutie este de 800-1.000 l/ha.

Timp de pauza inaintea recoltarii: 10-14 zile.

**Vita de vie:** 0,2%, 2kg/ha sau 20g la 10 litri ap? - împotriva manei (*Plasmopara viticola*), f?inare (*Uncinula leucator*), putregaiul cenu?iu (*Botrytis*). Se aplic? 2-3 tratamente, unul înainte si 2 dupa inflorit, la un interval de 7 – 14 zile intre stropiri.

Cantitatea de solutie este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauza: 14 zile

**Tomate, castrave?i, pepeni:** 0,2%, (2,0 kg/ha) sau 20g la 10 litri ap? - împotriva manei (*Phytophtora infestans*), f?in?rii (*Sphaerotheca fuliginea*) si alternariozei (*Alternaria solani*). Se aplica maximum 3 tratamente la un interval de 7 – 10 zile între stropiri.

Cantitatea de solutie este de 800 - 1000 l/ha.

Timp de pauza: 7 zile.

#### M?sur? de igien? ?i protec?ia muncii

#### Fraze de risc

Iritant pentru c?ile respiratorii ?i pentru ochi. A se evita contactul cu ochii ?i cu pielea.

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23  
300180 Timi?oara  
Rom?nia  
Timis  
+40 256 204912  
+40 256 204912

# D O R A D D A



În caz de contact spălati ?i cl?ti?i bine cu apă curat?.

În caz de intoxica?ie consulta?i urgent medicul.

### ***Fraze de siguran??***

Este interzis consumul de alimente, b?uturi ?i fumatul în timpul manipulării.

Folositi mânusi ?i echipament de protec?ie.

A se utiliza un ambalaj corespunz?tor pentru evitarea contamin?rii mediului.

### ***Mod de păstrare***

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, batrinilor si persoanelor neautorizate.

A se p?stra departe de alimente, b?uturi, furaje pt animale.

Se p?streaza la loc uscat si r?coros.

### ***Valabilitate***

Vezi termenul de pe ambalaj !

### **Pre? unitar**

- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !

- Pre?urile NU con?in TVA !