

TOPSIN M70 - kg



Evaluare: Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

TOPSIN M 70

Clasificare: fungicid sistemic, cu acțiune curativă și protectivă.

Substanța activă: 70% tiofanat metil.

Formulare: pulbere umectabilă.

Spectru de combatere: un spectru larg de combatere, a bolilor foliare din vegetația culturilor.

Cultura: legume, capsun, pomi fructiferi, vita de vie, cereale, silvicultură.

Mod de ambalare: 1kg.

Utilizare:

CEREALE

Erysiphe graminis (**Fîinarea cerealelor**) - **1 kg / ha**

Boli foliare - 1 kg / ha

TOMATE

Cladosporium fulvum (**Pîntarea cafenie**) - **0,1 %** (10 g / 10 l ap?)

Verticillium dahliae (**Uscarea vasculară**) - **0,05 % - 0,1 %** (10 g / 10 l ap?)

Fusarium oxysporum (**Fusarioza**) - **0,05 - 0,1 %** (10 g / 10 l ap?)

ARDEI și VINETE

Verticillium dahliae (**Uscarea vasculară**) - **0,05 % - 0,1 %** (10 g / 10 l ap?)

CASTRAVEți

Fusarium oxysporum (**Fusarioză**) - **0,05 % - 0,1 %** (10 g / 10 l ap?)

Verticillium dahliae (**Uscarea vasculară**) - **0,05 % - 0,1 %** (10 g / 10 l ap?)

PEPENI GALBENI

Fusarium oxysporum (**Fusarioză**) - **0,05 - 0,1 %** (10 g / 10 l ap?)

Mîr

Venturia inaequalis (**Rapînul mîrului**) - **0,07 %** (10 g / 10 l ap?)

Podosphaera leucotricha (**Fîinarea mîrului**) - **0,07 %** (10 g / 10 l ap?)

Pîr

Venturia pirina (**Rapînul pîrului**) - **0,07 %** (10 h / 14 l ap?)

Mycosphaerella sentina (**Pîntarea albă a frunzelor de pîr**) - **0,07 %** (10 h / 14 l ap?)

Diplocarpon sorauerii (Entomosporioza pârului) - 0,07 % (10 g / 14 l ap?)

CIRE? ?i VI?IN

Monilinia spp. (Monilioza fructelor) - 0,07 % (10 g / 14 l ap?)

Coccomyces hiemalis (Antracnoza) - 0,07 % (10 g / 14 l ap?)

C?P?UNI

Mycosphaerella fragariae (P?tarea alb? a frunzelor) - 0,07 % (10 g / 14 l ap?)

Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu) - 0,07 % (10 g / 14 l ap?)

VIT? DE VIE

Uncinula necator (F?inarea vi?ei de vie) - 0,1 - 0,12 % (10 g / 8 - 10 l ap? / 80 - 100 mp)

Botrytis cinerea (Putregaiul cenușiu) - 0,1 - 0,12 % (10 g / 8 - 10 l ap? / 80 - 100 mp)

SILVICULTUR?

Dothiostroma pini (Înroșirea acelor de pin) - 0,05 - 0,1 % (10 g / 10 l ap?)

- **Timpul de pauza**, de la ultimul tratament și până la recoltare; 3 zile la legume și pepeni, 15 zile la pomi și vita de vie, 40 zile la cereale.

Atentie!

-Pentru a proteja albinele și insectele polenizatoare, nu aplicați fungicidul în perioada de înflorire a plantelor.

-Foarte toxic pentru organismele acvatice. Poate produce mediului acvatic, daune pe termen lung.

- Înainte de folosirea produsului, citiți instrucțiunile de pe eticheta.

M?suri de igien? ?i protec?ia muncii

Fraze de risc

Iritant pentru căile respiratorii ?i pentru ochi. A se evita contactul cu ochii ?i cu pielea.

În caz de contact spălați ?i clătiți bine cu apă curată.

În caz de intoxicație consultați urgent medicul.

Fraze de siguran??

Este interzis consumul de alimente, băuturi ?i fumatul în timpul manipulării.

Folosiți mănuși ?i echipament de protecție.

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea contaminării mediului.

Mod de păstrare

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrînilor și persoanelor neautorizate.

A se păstra departe de alimente, băuturi, furaje pt animale.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

Valabilitate

Vezi termenul de pe ambalaj !

Pre? unitar

- Pentru livrări en-gros, solicitați list? de pre?uri !

- Pre?urile NU conțin TVA !