



## VERTIMEC 1,8 EC-250ml-acaricid



**Preț:** Nu a fost evaluat încă

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

### VERTIMEC 1,8 EC

**Mod de ambalare:** flacon 250ml

**Mod de acțiune:**

**Vertimec 1,8% EC** este un acaricid-insecticid pentru combaterea dăunătorilor din culturile de legume și pomi fructiferi. Produsul combate dăunătorii rezistenți la insecticidele din grupa piretroizilor sau organofosforicelor. Vertimec 1,8% EC pătrunde rapid în frunze (efect translaminar) și formează un depozit activ ce asigură controlul dăunătorilor pe o perioadă lungă de timp. Vertimec 1,8% EC acționează în principal prin ingestie și distruge dăunătorii care se hrănesc cu părțile tratate ale plantei. Combate formele mobile ale acarienilor și puricilor meliferi (adulți și larve), dar nu are efect ovicid.

După tratamentul cu Vertimec 1,8% EC, dăunătorii paralizază imediat, însă nivelul maxim de mortalitate este obținut la 3-5 zile. Vertimec 1,8% EC este omologat în majoritatea țrilor cu tradiție în cultura legumelor și fructelor.

| Cultura       | Spectru de combatere                                  | Doza                  | Perioada de aplicare                      | Timp de pauză* |
|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Ardei solarii | Acarianul lat<br>( <i>Polyphagotarsonemus latus</i> ) | 0,1%<br>(1 l/ha p.c., | aplicare la apariția primilor<br>acarieni | 3 zile         |

|                |         |                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Castraveti     | ser?    | Acarianul rosu comun<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )                 | 0,08%                                                                          | administrat foliar)<br>aplicare la aparitia primilor<br>acarieni                                                                                                                                  | 3 zile       |
|                | solarii | Acarianul comun<br>( <i>Tetranychus spp.</i> )                         | 0,1%<br>(1 l/ha p.c.,<br>administrat foliar                                    | aplicare la aparitia primilor<br>acarieni                                                                                                                                                         |              |
| Gerbera ser?   |         | Musca minier?<br>( <i>Lirymiza trifolii</i> )                          | 0,08%                                                                          | aplicare la aparitia primilor adulti<br>sau la depunerea primelor ou?                                                                                                                             | Gerbera ser? |
| M?r            |         | Acarianul rosu al pomilor<br>( <i>Panonychus ulmi</i> )                | 0,1%<br>(1,5 l/ha)                                                             | aplicare în perioada de dou?<br>s?pt?mâni dup? scuturarea<br>petalelor pentru a se asigura un<br>control de lung? durat?                                                                          | 28 de zile   |
|                |         | Acarianul comun<br>( <i>Tetranychus spp.</i> )                         | 1-1,5 l/ha (în functie<br>de nivelul de                                        |                                                                                                                                                                                                   |              |
|                |         | Acarianul filocoptid al m?rului ( <i>Aculus<br/>schlechtendali</i> )   | infestare)                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |              |
|                |         | Molia minier? circular?<br>( <i>Leucoptera scitella</i> )              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |
| P?r            |         | Minierul marmorat<br>( <i>Phyllonorichter blancardella</i> )           |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |
|                |         | Puricele melifer al p?rului<br>( <i>Psylla piri</i> )                  | 0,1-0,15%<br>(1-1,5 l/ha)                                                      | aplicare la 7-10 zile dup?<br>scuturarea petalelor, pentru<br>combaterea primei generatii de<br>purici meliferi si/sau la începutul<br>cresterii fructelor pentru<br>combaterea generatiei a doua | 28 de zile   |
| Prun           |         | Acarianul rosu al pomilor<br>( <i>Panonychus ulmi</i> )                | 0,1-0,15%<br>(1-1,5 l/ha)                                                      | aplicare în perioada de dou?<br>s?pt?mâni dup? scuturarea<br>petalelor, pentru a se asigura un<br>control de lung? durat?                                                                         | 28 de zile   |
|                |         | Acarianul comun<br>( <i>Tetranychus spp.</i> )                         | în functie de nivelul<br>de infestare                                          |                                                                                                                                                                                                   |              |
|                |         | Acarianul filocoptid al puietilor de prun<br>( <i>Aculus fockeni</i> ) |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |
|                |         |                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Tomate ser?    |         | Musca minier?<br>( <i>Lirionomyza trifolii</i> )                       | 0,08%                                                                          | aplicare la aparitia primilor adulti<br>sau la depunerea primelor ou?                                                                                                                             | 3 zile       |
| Vinete solarii |         | Acarianul lat<br>( <i>Polyphagotarsonemus latus</i> )                  | 0,1%<br>(1 l/ha p.c.,<br>administrat foliar)                                   | aplicare la aparitia primilor<br>acarieni                                                                                                                                                         | 3 zile       |
|                |         | Acarianul rosu comun<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )                 |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |              |
| Vit? de vie    |         | Acarianul vitei de vie<br>( <i>Tetranychus urticae</i> )               | 0,8-1 l/ha în 1000 l<br>ap?                                                    | aplicare la aparitia primilor<br>acarieni, în functie de presiunea<br>de infestare                                                                                                                | 14 zile      |
|                |         | P?ianjenul galic al vitei de vie<br>( <i>Eriophyes vitis</i> )         | (dozele se folosesc<br>diferentiat în functie<br>de presiunea de<br>infestare) |                                                                                                                                                                                                   |              |

**Timp de pauza** - interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament pân? la recoltare

### **M?suri de igien? ?i protec?ia muncii**

A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor si bătrânilor.

Se păstrează în ambalajul original, bine închis, la loc uscat si răcoros, departe de alimente, băuturi si furaje pt animale.

A se evita contactul cu pielea ?i cu ochii.

În caz cotrar, locul se spal? foarte bine cu ap? curat?.

Dac? s-a produs intoxicarea, anun?a?i de urgen?? medicul ?i urma?i tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii si depozitarii necorespunzatoare , producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate.

### **În conformitate cu legislatia EU:**

- este interzisa aruncarea ambalajului gol in ape curgatoare sau in orice surse de apa.

- este interzisa depozitarea sau utilizarea la o distanta mai mica de 50 m de la malul apelor.

**Valabilitate:** vezi data de pe ambalaj.

### **Pre? unitar**

**Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !**

**Pre?urile NU con?in TVA !**