

VERTIMEC 1,8EC-10ml - acaricid



Evaluare: Nu a fost evaluat încă?

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

VERTIMEC 1,8 EC

Mod de ambalare: flacon 10ml

Mod de acțiune:

Vertimec 1,8% EC este un acaricid-insecticid pentru combaterea dăunătorilor din culturile de legume și pomi fructiferi. Produsul combate dăunătorii rezistenți la insecticidele din grupa piretroizilor sau organofosforicelor. Vertimec 1,8% EC pătrunde rapid în frunze (efect translaminar) și formează un depozit activ ce asigură controlul dăunătorilor pe o perioadă lungă de timp. Vertimec 1,8% EC acționează în principal prin ingestie și distruge dăunătorii care se hrănesc cu părțile tratate ale plantei. Combate formele mobile ale acarienilor și puricilor meliferi (adulți și larve), dar nu are efect ovicid.

După tratamentul cu Vertimec 1,8% EC, dăunătorii paralizază imediat, însă nivelul maxim de mortalitate este obținut la 3-5 zile.

Vertimec 1,8% EC este omologat în majoritatea țrilor cu tradiție în cultura legumelor și fructelor.

Cultura	Spectru de combatere	Doza	Perioada de aplicare	Timp de pauz?*
Ardei solarii	Acarianul lat (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>)	0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar)	aplicare la aparitia primilor acarieni	3 zile
Castraveti	ser? Acarianul rosu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,08%	aplicare la aparitia primilor acarieni	3 zile
	solarii Acarianul comun (<i>Tetranychus spp.</i>)	0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar)	aplicare la aparitia primilor acarieni	
Gerbera ser?	Musca minier? (<i>Liryomiza trifolli</i>)	0,08%	aplicare la aparitia primilor adulti sau la depunerea primelor ou?	Gerbera ser?
M?r	Acarianul rosu al pomilor (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,1% (1,5 l/ha)	aplicare în perioada de dou? s?pt?mâni dup? scuturarea petalelor pentru a se asigura un control de lung? durat?	28 de zile
	Acarianul comun (<i>Tetranychus spp.</i>)	1-1,5 l/ha (în functie de nivelul de infestare)		
	Acarianul filocoptid al m?rului (<i>Aculus schlechtendali</i>)			
	Molia minier? circular? (<i>Leucoptera scitella</i>)			
	Minierul marmorat (<i>Phyllonorichter blancardella</i>)			
P?r	Puricele melifer al p?rului (<i>Psylla piri</i>)	0,1-0,15% (1-1,5 l/ha)	aplicare la 7-10 zile dup? scuturarea petalelor, pentru combaterea primei generatii de	28 de zile

			purici meliferi si/sau la începutul creșterii fructelor pentru combaterea generației a doua	
Prun	Acarianul roșu al pomilor (<i>Panonychus ulmi</i>) Acarianul comun (<i>Tetranychus spp.</i>) Acarianul filocoptid al puietilor de prun (<i>Aculus fockeni</i>)	0,1-0,15% (1-1,5 l/ha) în funcție de nivelul de infestare	aplicare în perioada de două săptămâni după scuturarea petalelor, pentru a se asigura un control de lungă durată?	28 de zile
Tomate seră	Musca minieră (<i>Liriomyza trifolii</i>)	0,08%	aplicare la apariția primilor adulți sau la depunerea primelor ouă?	3 zile
Vinete solarii	Acarianul lat (<i>Polyphagotarsonemus latus</i>) Acarianul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,1% (1 l/ha p.c., administrat foliar)	aplicare la apariția primilor acarieni	3 zile
Vită de vie	Acarianul vitei de vie (<i>Tetranychus urticae</i>) Păianjenul galic al vitei de vie (<i>Eriophyes vitis</i>)	0,8-1 l/ha în 1000 l apă? (dozele se folosesc diferențiat în funcție de presiunea de infestare)	aplicare la apariția primilor acarieni, în funcție de presiunea de infestare	14 zile

Timp de pauză - interval minim de timp de la aplicarea ultimului tratament până la recoltare

Măsuri de igienă și protecția muncii

A nu se folosi ca aliment sau furaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și bătrânilor.

Se păstrează în ambalajul original, bine închis, la loc uscat și răcoros, departe de alimente, băuturi și furaje pentru animale.

A se evita contactul cu pielea și cu ochii.

În caz contrar, locul se spală foarte bine cu apă curată.

Dacă s-a produs intoxicația, anunțați de urgență medicul și urmați tratamentul prescris de medic.

Pentru daunele care apar din cauza folosirii și depozitării necorespunzătoare, producătorul nu își asumă nici o responsabilitate.

În conformitate cu legislația EU:

- este interzisă aruncarea ambalajului gol în ape curgătoare sau în orice surse de apă.

- este interzisă depozitarea sau utilizarea la o distanță mai mică de 50 m de la malul apelor.

Valabilitate: vezi data de pe ambalaj.

Preț unitar

Pentru livrări en-gros, solicitați listă de prețuri !

Prețurile NU conțin TVA !