

Zeama bordeleza 50g



Preț mediu: 9,17 lei
Prețul de vânzare 10,00 lei
Prețul de vânzare fără taxe 9,17 lei
Reducere
Valoarea taxei 0,83 lei

[Pune o întrebare despre acest produs](#)

ZEAMĂ BORDELEZĂ tip MIF

Fungicid de contact - conține 20% cupru metalic sub forma de sulfat de cupru neutralizat. Este un amestec de var și sulfat de cupru sub forma de pulbere umectabilă.

Toxicitate: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

Greutate netă: 50g

Descriere: Zeama bordeleză este un fungicid cupric de mare eficacitate, care combate un spectru larg de boli în legumicultură, pomicultură, viticultură. Este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor și are o eficacitate îndelungată. Se recomandă ca după fiecare ploaie, să se facă stropiri.

Spectrul bolilor combătute:

1. VIȘA DE VIE - concentrația recomandată este de 0,5%

Plasmopara viticola - mană

2. POMI FRUCTIFERI - concentrația recomandată este de 0,5%

Polystigma rubrum - petărea roșie a frunzelor la prun

Stigmata carpophylla - ciuruirea frunzelor la prun, cais, persic, cireș, vișin

Monilinia spp - monilioza fructelor

Taphrina deformans - bășicarea frunzelor la piersic, nectarin

Blumeriella jaapii - petărea frunzelor la cireș și vișin

Venturia inaequalis - rapăn la măr - tratamentul se face prefloral

Venturia pirina - rapăn la păr

3. TOMATE - concentrația recomandată este de 0,75%

Phytophthora infestans - mană

Alternaria solani - alternarioză

Xanthomonas vesicatoria - petărea frunzelor

Pseudomonas tomato - petărea pustulară

4. CASTRAVEȚI - concentrația recomandată este de 0,75%

Pseudomonas lacrymans - petărea unghiulară

Pseudoperonospora cubensis - mană

5. FASOLE - concentrația recomandată este de 0,75%

Xanthomonas phaseoli - arsura comună

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timișoara
România
Timiș
+40 256 204912
+40 256 204912



Pseudomonas phaseolicola - arsura aureolat?

5. CEAP? - concentrația recomandat? este de 0,75%

Peronospora destructor - man?

Utilizare:

Se iau 50g de produs și se dizolvă în:

- 10 l de apă pentru tratamente în viticultură,
- 8 l de apă pentru tratamente în legumicultură,
- 5-10 l de apă pentru tratamente în pomicultură.

Se recomandă ca după 8-10 zile să se repete tratamentul.

Timp de pauză: După aplicarea ultimului tratament și până la recoltare trebuie să treacă 21 zile.

ATENȚIE!

Este foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.

A nu se inspira praful.

NU mâncați, nu beți și nu fumați în timpul utilizării produsului.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, bătrînilor și persoanelor neautorizate.

Este iritant pt ochi. În caz de contact cu ochii, spălați bine cu apă curată și adresați-vă medicului.

Se păstrează la loc uscat și răcoros.

Punga deschisă se ține departe de alimente, băuturi și furaje pt animale.

Acest produs și ambalajul său se vor depozita ca un deșeu periculos.

A nu se arunca ambalajul sau resturile nefolosite de produs oriunde în mediul înconjurător.

Valabilitate: vezi ambalaj.