S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

# Zeama Bordeleza 50g






Pre?ul de vânzare cu reducere 6,42 lei
Pre?ul de vânzare 7,00 lei
Pre?ul de vânzare f?r? taxe 6,42 lei
Reducere
Valoarea taxei 0,58 lei

Pune o întrebare despre acest produs

S.C. Doradda S.R.L.

Bul. Regele Carol I, Nr. 23
300180 Timi?oara
Rom?nia
Timis
+40 256 204912
+40 256 204912

**ZEAMĂ BORDELEZĂ tip MIF**

**Fungicid de contact** - con?ine 20% cupru metalic sub forma de sulfat de cupru neutralizat. Este un amestec de var si sulfat de cupru sub forma de pulbere umectabila.
**Toxicitate**: toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
**Greutate neta: 50g**
**Descriere:** Zeama bordelez? este un fungicid cupric de mare eficacitate, care combate un spectru larg de boli în legumicultur?, pomicultur?, viticultur?. Este compatibil cu majoritatea insecto-fungicidelor ?i are o eficacitate îndelungat?. Se recomand? ca dup? fiecare ploaie, s? se fac? stropiri.
**Spectrul bolilor comb?tute:**
**1. VI?A DE VIE - concentra?ia recomandat? este de 0,5%**
Plasmopara viticola - man?
**2. POMI FRUCTIFERI - concentra?ia recomandat? este de 0,5%**
Polystigma rubrum - p?tarea ro?ie a frunzelor la prun
Stigmina carpophyla - ciuruirea frunzelor la prun, cais, persic, cire?, vi?in
Monilinia spp - monilioza fructelor
Taphrina deformans - b??icarea frunzelor la piersic, nectarin
Blumeriella jaapii - p?tarea frunzelor la cire? ?i vi?in
Venturia inaequalis - rap?n la m?r - tratamentul se face prefloral
Venturia pirina - rap?n la p?r
**3. TOMATE - concentra?ia recomandat? este de 0,75%**
Phytophtora infestans - man?
Alternaria solani - alternarioz?
Xanthomonas vesicatoria - p?tarea frunzelor
Pseudomonas tomato - p?tarea pustular?
**4. CASTRAVE?I - concentra?ia recomandat? este de 0,75%**
Pseudomonas lacrymans - p?tarea unghiular?
Pseudoperonospora cubensis - man?
**5. FASOLE - concentra?ia recomandat? este de 0,75%**
Xanthomonas phaseoli - arsura comun?
Pseudomonas phaseolicola - arsura aureolat?
**5. CEAP? - concentra?ia recomandat? este de 0,75%**
Peronospora destructor - man?

**Utilizare**:
Con?inutul unui plic se dizolv? în:
- 10 l de ap? pentru tratamente în viticulturã,
- 7-8 l de ap? pentru tratamente în legumiculturã,
- 5-10 l de ap? pentru tratamente în pomiculturã.

Se recomand? ca dup? 8-10 zile s? se repete tratamentul.
**Timp de pauzã:** Dup? aplicarea ultimului tratament ?i pân? la recoltare trebuie s? treac? 21 zile.
**ATEN?IE**!
Este foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic.
A nu se inspira praful.
NU mânca?i, nu be?i ?i nu fuma?i în timpul utiliz?rii produsului.
A nu se lãsa la îndemâna copiilor, batrinilor si persoanelor neautorizate.
Este iritant pt ochi. În caz de contact cu ochii, spãlati bine cu apã curatã ?i adresati-vã medicului.
Se pãstreazã la loc uscat si rãcoros.
Punga deschisã se ?ine departe de alimente, bãuturi ?i furaje pt animale.
Acest produs ?i ambalajul s?u se vor depozita ca un de?eu periculos.
A nu se arunca ambalajul sau resturile nefolosite de produs oriunde în mediul înconjur?tor.
**Valabilitate**: vezi ambalaj.

**Pre? unitar**
**- Pentru livr?ri en-gros, solicita?i list? de pre?uri !**
**- Pre?urile NU con?in TVA !**